

Unkomplizierte Cystitis

<u>Zielgruppe</u>	<u>Standard</u>	<u>Alternative</u> (Penicillin-Allergie)
Unkomplizierter* unterer HWI der Frau OHNE Risikofaktoren (*prämenopausal, nicht schwanger, kein DK, keine Immunsuppression)	<p>Fosfomycin p.o. 3 g als Einmalgabe nüchtern</p> <p>oder</p> <p>Pivmecillinam p.o. 3x 400 mg über 3-5d</p> <p>oder</p> <p>Nitrofurantoin 4x50 mg p.o. über 7d</p> <p>oder</p> <p>(Nitroxolin 3x250 mg p.o. über 5d, nicht Hausliste!)</p>	<p>Falls keine antibiotische Therapie:</p> <p>Ibuprofen 3x400 mg p.o. über 3-5d</p> <p>Canephron uno 3x1 p.o. für 7d</p>
Unkomplizierter unterer HWI bei Schwangeren	<p>Fosfomycin p.o. 3g als Einmalgabe nüchtern</p> <p>oder</p> <p>Pivmecillinam p.o. 3x 400 mg über 3-5 d</p>	Cefpodoxim p.o. 2x 100 mg über 3 d
Unkomplizierter unterer HWI beim (jüngeren) Mann ohne Beteiligung der Prostata	<p>Pivmecillinam p.o. 3x 400 mg über 5d</p> <p>oder</p> <p>Nitrofurantoin p.o. 4x50 mg über 7d</p>	Cotrimoxazol p.o. 2x 800/160 mg über 7d